











Akuter Bronchospasmus

Akuter Bronchospasmus

	A Stridor, Verlegung der Atemwege B Tachypnoe, SpO ₂ -Abfall C Tachykardie D Angst, Agitiertheit, Somnolenz E Patientengeschichte: COPD? Asthma bronchiale?	
	Akute Atemnot Erhöhte Atemfrequenz Atemgeräusche (Giemen, Brummen, Pfeifen) Verlängertes Expirium	Diagnose 
	<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen	Keypoints
	Fenoterol / Ipratropium inhal. 6.-12. vLJ: 0,6 ml mit 2 ml NaCl verdünnt ab 12. vLJ: 1,8 ml mit 2 ml NaCl verdünnt	KI:  < 6. vLJ Kinder: HF > 180
	NW: Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg	
	Reevaluation (ABCDE)	
	Berodual LS®: ab dem 6. vLJ (bis zum 12.) 6 Hübe + 2 ml NaCl ab dem 12. vLJ 18 Hübe + 2 ml NaCl  Berodualin® ab dem 6. vLJ (bis zum 12.) 12 Tropfen + 2 ml NaCl ab dem 12. vLJ 36 Tropfen + 2 ml NaCl Weitere Möglichkeiten, sollte die Inhalation keine Wirkung zeigen: <ul style="list-style-type: none">• CPAP nach Boussignac• Assistierte Beatmung	

Revision #4

Created 23 December 2022 19:43:22 by Admin

Updated 9 February 2023 07:04:04 by Admin