











# Akuter Bronchospasmus

## Akuter Bronchospasmus

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>A</b> Stridor, Verlegung der Atemwege<br><b>B</b> Tachypnoe, SpO <sub>2</sub> -Abfall<br><b>C</b> Tachykardie<br><b>D</b> Angst, Agitiertheit, Somnolenz<br><b>E</b> Patientengeschichte: COPD? Asthma bronchiale?  |   |
|    | Akute Atemnot<br>Erhöhte Atemfrequenz<br>Atemgeräusche (Giemen, Brummen, Pfeifen)<br>Verlängertes Expirium   | <b>Diagnose</b><br>                           |
|   | <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen   | <b>Keypoints</b>   |
|  | <b>Fenoterol / Ipratropium inhal.</b><br>6.-12. vLJ: 0,6 ml mit 2 ml NaCl verdünnt<br>ab 12. vLJ: 1,8 ml mit 2 ml NaCl verdünnt  | <b>KI:</b> <br>< 6. vLJ<br>Kinder: HF > 180 |
|   | <b>NW:</b> Zittern/Unruhe<br>Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg  |  |
|  | <br>Reevaluation (ABCDE)<br><br><b>Berodual LS®:</b><br>ab dem 6. vLJ (bis zum 12.) 6 Hübe + 2 ml NaCl<br>ab dem 12. vLJ 18 Hübe + 2 ml NaCl<br> <b>Berodualin®</b><br>ab dem 6. vLJ (bis zum 12.) 12 Tropfen + 2 ml NaCl<br>ab dem 12. vLJ 36 Tropfen + 2 ml NaCl<br><br>Weitere Möglichkeiten, sollte die Inhalation keine Wirkung zeigen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CPAP nach Boussignac</li><li>▪ Assistierte Beatmung</li></ul> | <b>Monitoring</b>  |