











# Akutes Koronarsyndrom (i.v.)

## Akutes Koronarsyndrom

	<b>A</b> je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt <b>B</b> AF? SpO <sub>2</sub> ? Lungenödem? <b>C</b> Puls peripher tastbar? Haut kaltschweißig? RR? Recap? <b>D</b> Bewusstseinstörung? Synkope? <b>E</b> Anamnese nach SAMPLER	
	ischaemietypischer Thoraxschmerz	<b>Diagnose</b> 
	<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> 12 Kanal EKG innerhalb von 10 Minuten <input type="checkbox"/> Aufkleben der DefiPads bei STEMI bzw. bei kritischem Patient <input type="checkbox"/> Wenn orale Gabe nicht möglich ist (Bsp. Schluckstörung, Erbrechen ...)	<b>Keypoints</b>
	<b>Acetylsalicylsäure i.v.</b> Erwachsene: 250 mg i.v. (2,5 ml)  <b>NW:</b> keine Relevanten	<b>KI:</b>  Kinder
	 Reevaluation (ABCDE)	
	 KEINE Wiederholung der Acetylsalicylsäure	

Revision #2

Created 10 July 2024 17:29:08 by Admin

Updated 8 October 2024 09:41:07 by Admin