











Akutes Koronarsyndrom (i.v.)

Akutes Koronarsyndrom

	A je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt B AF? SpO ₂ ? Lungenödem? C Puls peripher tastbar? Haut kaltschweißig? RR? Recap? D Bewusstseinstörung? Synkope? E Anamnese nach SAMPLER	 Monitoring
	Diagnose ischaemietypischer Thoraxschmerz 	
	Keypoints <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen<input type="checkbox"/> 12 Kanal EKG innerhalb von 10 Minuten<input type="checkbox"/> Aufkleben der DefiPads bei STEMI bzw. bei kritischem Patient<input type="checkbox"/> Wenn orale Gabe nicht möglich ist (Bsp. Schluckstörung, Erbrechen ...)	
	Acetylsalicylsäure i.v. Erwachsene: 250 mg i.v. (2,5 ml) KI:  Kinder NW: keine Relevanten	
	 Reevaluation (ABCDE)  KEINE Wiederholung der Acetylsalicylsäure	

Revision #1

Created 10 July 2024 15:29:08 by Admin

Updated 10 July 2024 15:37:05 by Admin