












Bestehender zerebraler Krampfanfall

Bestehender zerebraler Krampfanfall

	<p>A bedroht, verlegt, Aspiration B Abnorme Atmung C Kreislauf vorhanden? D Pupillengröße & -reaktion? E Stuhl- bzw. Harnverlust? Zungenbiss?</p>					
	<p>Plötzliche Bewusstlosigkeit Tonisch-klonische Krämpfe Passagerer Atemstillstand</p>	<p>Diagnose</p> 				
	<p><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> CAVE: Atem-Kreislaufstillstand -> wechsel zu ALS Algorithmus <input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdschutz</p>	<p>Keypoints</p>				
	<p>Diazepam rektal</p> <table border="1"> <tr> <td>1.-3. vLJ / 10-15 kg:</td> <td>5 mg rektal</td> </tr> <tr> <td>3.-7. vLJ:</td> <td>10 mg rektal</td> </tr> </table>	1.-3. vLJ / 10-15 kg:	5 mg rektal	3.-7. vLJ:	10 mg rektal	<p>KI:  < 1. vLJ</p>
	1.-3. vLJ / 10-15 kg:	5 mg rektal				
3.-7. vLJ:	10 mg rektal					
<p>Midazolam nasal über MAD</p> <p>ab dem 8. vLJ: Gesamt 10 mg nasal Midazolam® 3 ml / 15 mg = 1 ml (5mg) pro Naseloch</p>	<p>KI:  < 8. vLJ</p>					
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <hr/> <p> KEINE Wiederholung der Benzodiazepine.</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Monitoring</p>				

Revision #3

Created 24 December 2022 06:11:22 by Admin

Updated 9 February 2023 07:06:07 by Admin