











Bestehender zerebraler Krampfanfall

Bestehender zerebraler Krampfanfall

	A bedroht, verlegt, Aspiration B Abnorme Atmung C Kreislauf vorhanden? D Pupillengröße & -reaktion? E Stuhl- bzw. Harnverlust? Zungenbiss?	 Monitoring				
	Diagnose Plötzliche Bewusstlosigkeit Tonisch-klonische Krämpfe Passagerer Atemstillstand 					
	Keypoints <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen<input type="checkbox"/> CAVE: Atem-Kreislaufstillstand -> wechsel zu ALS Algorithmus<input type="checkbox"/> Eigen- und Fremdschutz					
	Diazepam rektal <table><tr><td>1.-3. vLJ / 10-15 kg:</td><td>5 mg rektal</td></tr><tr><td>3.-7. vLJ:</td><td>10 mg rektal</td></tr></table>		1.-3. vLJ / 10-15 kg:	5 mg rektal	3.-7. vLJ:	10 mg rektal
	1.-3. vLJ / 10-15 kg:	5 mg rektal				
	3.-7. vLJ:	10 mg rektal				
NW: Müdigkeit, Atemdepression						
	Midazolam nasal über MAD ab dem 8. vLJ: Gesamt 10 mg nasal Midazolam® 3 ml / 15 mg = 1 ml (5mg) pro Naseloch	KI:  < 8. vLJ				
	NW: Müdigkeit, Atemdepression					
	 Reevaluation (ABCDE)					
	 KEINE Wiederholung der Benzodiazepine.					

Revision #3

Created 24 December 2022 06:11:22 by Admin

Updated 9 February 2023 07:06:07 by Admin