











Fieber mit Krampfanfall bei Kindern

Fieber mit Krampfanfall bei Kindern

	<p>A In der Regel keine Beeinträchtigung zu erwarten</p> <p>B Tachypnoe? Zyanose? Einziehungen? Nasenflügeln?</p> <p>C Tachykardie? Bradykardie?</p> <p>D Altersentsprechende Reaktion?</p> <p>E Anamnestisch Fieberkrämpfe bekannt? Aktueller Infekt?</p>	 Monitoring					
	<p>Fieber > 38,5 °C und Krampfanamnese (aktuell oder anamnestisch)</p> <p>Kind krampft noch?</p> <p>Wechsel zu Algorithmus „Bestehender zerebraler Krampfanfall“!</p>		Diagnose 				
	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen<input type="checkbox"/> Kind krampft noch? ->Wechsel zu Algorithmus Bestehender Zerebraler Krampfanfall<input type="checkbox"/> Temperatur nachmessen<input type="checkbox"/> Medikation durch Eltern?		Keypoints				
	<p>Paracetamol Supp. rektal</p> <table><tr><td>6. LM–2. vLJ:</td><td>125 mg rektal</td></tr><tr><td>2.–8. vLJ:</td><td>250 mg rektal</td></tr></table>		6. LM–2. vLJ:	125 mg rektal	2.–8. vLJ:	250 mg rektal	<p>KI: </p> <p>< 6. vLM Paracetamolgabe in den letzten 6h</p>
6. LM–2. vLJ:	125 mg rektal						
2.–8. vLJ:	250 mg rektal						
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p> KEINE Wiederholung des Paracetamols</p>						

Revision #3

Created 24 December 2022 06:06:33 by Admin

Updated 9 February 2023 07:04:55 by Admin