












Hypertensiver Notfall

Hypertensiver Notfall

	A je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt B AF? SpO ₂ ? Lungenödem? C Angina Pectoris? Aortensyndrom? D neurologisches Defizit (siehe unten) E Hypertensive urgency ≠ emergency	 Monitoring	
	RR über 200mmHg (systolisch) mit Symptomatik: - Angina Pectoris - Lungenödem - neurolog. Defizit - Kopfschmerz - Sehstörung		Diagnose 
	<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen		Keypoints
	Venenzugang (i.v.)		
	Urapidil i.v. Erwachsene: 5 mg i.v. Ziel: Senkung des Blutdrucks um max. 25% des Ausgangswertes UND nicht unter 160 mmHg (systolisch) NW: übermäßiger Blutdruckabfall		KI:  Kinder
	 Reevaluation (ABCDE)  Wiederholung alle 5 Minuten nach Blutdruckkontrolle bis Ziel erreicht: Senkung des Blutdrucks um max. 25% des Ausgangswertes UND nicht unter 160 mmHg (systolisch) NICHT mehr als 25 mg Urapidil verabreichen!		

Revision #3

Created 24 December 2022 09:28:45 by Admin

Updated 9 February 2023 06:21:44 by Admin