












Hypoglykämie

Hypoglykämie

| | | |
|---|--|--|
|  | A je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt B Zyanose? AF? SpO ₂ ? Auskultation: bds. belüftet? C Hämodynamische Differentialdiagnose? D Bewusstseinsstörung - neurologische Differentialdiagnose? E Typ I Diabetes? Insulinpumpe? |  Monitoring |
|  | Diagnose Bewusstseinsstörung UND Blutzucker unter 50 mg/dL  | |
|  | Keypoints <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> ggf. Insulinpumpe diskonnektieren | |
|  | Venenzugang (i.v.) | |
|  | Glucose 33% i.v. Erwachsene 13,2 g rasch i.v. (40 ml) Kinder: 6,6 g rasch i. v. (20 ml) KI:  < 6. vLJ NW: Lokale Venenreizung | |
|  |  Reevaluation (ABCDE)  Mit 20 ml isotoner Elektrolytlösung i.v. nachspülen. Wiederholung der Glucose-Boli bis der Normwert erreicht ist. | |

Revision #5

Created 24 December 2022 08:46:23 by Admin

Updated 9 February 2023 06:17:53 by Admin