












# Hypoglykämie

## Hypoglykämie

	<b>A</b> je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt <b>B</b> Zyanose? AF? SpO <sub>2</sub> ? Auskultation: bds. belüftet? <b>C</b> Hämodynamische Differentialdiagnose? <b>D</b> Bewusstseinsstörung - neurologische Differentialdiagnose? <b>E</b> Typ I Diabetes? Insulinpumpe?	 <b>Monitoring</b>
	<b>Diagnose</b> Bewusstseinsstörung <b>UND</b> Blutzucker unter 50 mg/dL 	
	<b>Keypoints</b> <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> ggf. Insulinpumpe diskonnektieren	
	<b>Venenzugang (i.v.)</b>	
	<b>Glucose 33% i.v.</b> Erwachsene 13,2 g rasch i.v. (40 ml) Kinder: 6,6 g rasch i. v. (20 ml) <b>KI:</b>  < 6. vLJ <b>NW:</b> Lokale Venenreizung	
	 Reevaluation (ABCDE)  Mit 20 ml isotoner Elektrolytlösung i.v. nachspülen. Wiederholung der Glucose-Boli bis der Normwert erreicht ist.	

Revision #5

Created 24 December 2022 08:46:23 by Admin

Updated 9 February 2023 06:17:53 by Admin