

Schwellung der oberen Atemwege

Schwellung der oberen Atemwege

	<p>A Stridor, Schwellung der Atemwege B Tachypnoe, SpO₂-Abfall C Schwitzen, Blässe, Rekap > 4 Sek., Hypotonie D E</p>	
	<p>Inspiratorischer Stridor A+B Problem z.B. bei Epiglottitis, Inhalationstrauma</p>	<p>Diagnose</p> 
	<p><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</p>	<p>Keypoints</p>
	<p>Adrenalin (1:1000) via Verneblermaske 1 mg (1 ml) unverdünnt mit 8 l/Min. Sauerstoff vernebeln</p> <p>NW: Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg</p>	<p>KI:  keine</p>
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p>Keine Besserung nach 5 Minuten? Bei Patienten > 3. vLJ einmalige Wiederholung der Inhalation in gleicher Dosierung (1 mg bzw. 1 ml Suprarenin® 1:1000) möglich</p> <p> Evtl. kann es nötig sein, den Algorithmus „schwere Anaphylaktische Reaktion“ parallel anzuwenden</p>	<p>Monitoring</p>

Revision #5

Created 23 December 2022 18:24:18 by Admin

Updated 9 February 2023 06:01:22 by Admin