


Schwellung der oberen Atemwege

Schwellung der oberen Atemwege

	A Stridor, Schwellung der Atemwege B Tachypnoe, SpO ₂ -Abfall C Schwitzen, Blässe, Rekap > 4 Sek., Hypotonie D E	 Monitoring
	Diagnose Inspiratorischer Stridor A+B Problem z.B. bei Epiglottitis, Inhalationstrauma 	
	Keypoints <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen	
	Adrenalin (1:1000) via Verneblermaske 1 mg (1 ml) unverdünnt mit 8 l/Min. Sauerstoff vernebeln KI:  keine NW: Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg	
	 Reevaluation (ABCDE) Keine Besserung nach 5 Minuten? Bei Patienten > 3. vLJ einmalige Wiederholung der Inhalation in gleicher Dosierung (1 mg bzw. 1 ml Suprarenin® 1:1000) möglich  Evtl. kann es nötig sein, den Algorithmus „schwere Anaphylaktische Reaktion“ parallel anzuwenden	

Revision #5

Created 23 December 2022 18:24:18 by Admin

Updated 9 February 2023 06:01:22 by Admin