



# Schwellung der oberen Atemwege

## Schwellung der oberen Atemwege

	<b>A</b> Stridor, Schwellung der Atemwege <b>B</b> Tachypnoe, SpO <sub>2</sub> -Abfall <b>C</b> Schwitzen, Blässe, Rekap > 4 Sek., Hypotonie <b>D</b> <b>E</b>	
	Inspiratorischer Stridor A+B Problem z.B. bei Epiglottitis, Inhalationstrauma	<b>Diagnose</b> 
	<input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen	<b>Keypoints</b>
	<b>Adrenalin (1:1000) via Verneblermaske</b> 1 mg (1 ml) unverdünnt mit 8 l/Min. Sauerstoff vernebeln	<b>KI:</b>  keine
	<b>NW:</b> Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg	
	Reevaluation (ABCDE)	
	Keine Besserung nach 5 Minuten? Bei Patienten > 3. vLJ einmalige Wiederholung der Inhalation in gleicher Dosierung (1 mg bzw. 1 ml Suprarenin® 1:1000) möglich  Evtl. kann es nötig sein, den Algorithmus „schwere Anaphylaktische Reaktion“ parallel anzuwenden	

Revision #5

Created 23 December 2022 19:24:18 by Admin

Updated 9 February 2023 07:01:22 by Admin