


# Schwellung der oberen Atemwege

## Schwellung der oberen Atemwege

	<p><b>A</b> Stridor, Schwellung der Atemwege  <b>B</b> Tachypnoe, SpO<sub>2</sub>-Abfall  <b>C</b> Schwitzen, Blässe, Rekap &gt; 4 Sek., Hypotonie  <b>D</b>  <b>E</b></p>	
	<p>Inspiratorischer Stridor  A+B Problem  z.B. bei Epiglottitis, Inhalationstrauma</p>	<p><b>Diagnose</b></p>  <p>Monitoring</p>
	<p><b>Keypoints</b></p> <p><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</p>	
	<p><b>Adrenalin (1:1000) via Verneblermaske</b>  1 mg (1 ml) unverdünnt mit 8 l/Min. Sauerstoff vernebeln</p> <p><b>NW:</b> Zittern/Unruhe  Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg</p>	<p><b>KI:</b>  keine</p>
	<p> Reevaluation (ABCDE)</p> <p>Keine Besserung nach 5 Minuten?  Bei Patienten &gt; 3. vLJ einmalige Wiederholung der Inhalation in gleicher Dosierung (1 mg bzw. 1 ml Suprarenin® 1:1000) möglich</p> <p> Evtl. kann es nötig sein, den Algorithmus „schwere Anaphylaktische Reaktion“ parallel anzuwenden</p>	

Revision #5  
Created 23 December 2022 18:24:18 by Admin  
Updated 9 February 2023 06:01:22 by Admin