











Schwere anaphylaktische Reaktion

Schwere anaphylaktische Reaktion

	A Stridor, Schwellung der Atemwege B Tachypnoe, SpO ₂ -Abfall C Schwitzen, Blässe, Rekap > 4 Sek., Hypotonie D Somnolenz, Schwindel E Rötung der Haut, Quaddeln	 Monitoring						
	Diagnose Ereignisbezogener Zusammenhang (Insektenstich, Medikamente, Nahrungsmittel, etc.) Schwere Atemnot, Stridor, Bronchospasmus Schocksymptome Eventuell Rötung der Haut, Quaddeln 							
	Keypoints <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> Auslöser entfernen <input type="checkbox"/> Reanimationsbereitschaft							
	Adrenalin (Autoinjektor) i.m. <table><tr><td>3.–6. vLJ:</td><td>0,15 mg i.m.</td></tr><tr><td>6.–12. vLJ:</td><td>0,3 mg i.m.</td></tr><tr><td>ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)</td><td>0,45 mg i.m.</td></tr></table> KI:  < 15 kg KG und < 3. vLJ NW: Zittern/Unruhe Herzfrequenzanstieg/Blutdruckanstieg		3.–6. vLJ:	0,15 mg i.m.	6.–12. vLJ:	0,3 mg i.m.	ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)	0,45 mg i.m.
3.–6. vLJ:	0,15 mg i.m.							
6.–12. vLJ:	0,3 mg i.m.							
ab 12. vLJ: (beide Autoinjektoren)	0,45 mg i.m.							
	 Reevaluation (ABCDE)  Keine Besserung nach 5 Minuten? Einmalige Wiederholung von Adrenalin (Suprarenin® 1:1000) i.m. in folgenden Dosierungen erlaubt: 3. bis 6. vLJ: 0,15mg i.m. = 0,15 ml 6. bis 12- vLJ: 0,3 mg i.m. = 0,3 ml > 12 vLJ: 0,5 mg i.m. = 0,5 ml							

Revision #5

Created 24 December 2022 08:17:08 by Admin

Updated 9 February 2023 05:57:55 by Admin