












Starke Schmerzen

Starke Schmerzen

	<p>A je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt</p> <p>B Tachypnoe?</p> <p>C Tachykardie?, Blässe?</p> <p>D Schmerzen, Schwindel?, Unruhe?</p> <p>E Ereignisbezogener Zusammenhang (Trauma, ..)? Schonhaltung, Mimik, Gestik</p>	
	<p>allgemeine atraumatische Schmerzen ab NRS > 3</p> <p>Viszeraler Schmerz ab NRS > 3</p> <p>Traumatisch bedingter Schmerz</p>	<p>Diagnose</p> 
	<p><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</p>	<p>Keypoints</p>
	<p>Venenzugang (i.v.)</p>	
	<p>Methoxyfluran inhal.</p> <p>ab 18. vLJ: 1E</p>	
	<p>und/oder NW: keine Nebenwirkungen zu erwarten</p>	
	<p>Paracetamol i.v.</p> <p>ab Pubertät: 1000 mg i.v.</p> <p>12. vLJ - Pubertät 15 mg / kg KG i.v. (1,5 ml)</p>	
	<p>NW: keine Nebenwirkungen zu erwarten</p>	
	<p> Reevaluation (ABCDE, NSR)</p> <p> Methoxyfluran: 1x wiederholbar</p> <p> Paracetamol: nicht wiederholbar</p>	

Monitoring

