














# Starke Schmerzen

## Starke Schmerzen

	<p><b>A</b> je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt</p> <p><b>B</b> Tachypnoe?</p> <p><b>C</b> Tachykardie?, Blässe?</p> <p><b>D</b> Schmerzen, Schwindel?, Unruhe?</p> <p><b>E</b> Ereignisbezogener Zusammenhang (Trauma, ..)? Schonhaltung, Mimik, Gestik</p>		
	<p>allgemeine atraumatische Schmerzen ab NRS &gt; 3</p> <p>Viszeraler Schmerz ab NRS &gt; 3</p> <p>Traumatisch bedingter Schmerz</p>	<p><b>Diagnose</b></p> 	
	<p><input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen</p>	<p><b>Keypoints</b></p>	
	<p><b>Venenzugang (i.v.)</b></p>		
	<p><b>Methoxyfluran inhal.</b></p> <p>ab 18. vLJ: 1E</p>		<p><b>KI:</b> </p> <p>Kinder, Kopfverletzung, kardiovaskuläre Instabilität, resp. Insuffizienz, Niereninsuffizienz, Bewusstlosigkeit, maligne Hyperthermie</p>
	<p>und/oder <b>NW:</b> keine Nebenwirkungen zu erwarten</p>		
	<p><b>Paracetamol i.v.</b></p> <p>ab Pubertät: 1000 mg i.v.</p> <p>12. vLJ - Pubertät 15 mg / kg KG i.v. (1,5 ml)</p>		<p><b>KI:</b> </p> <p>&lt; 12. vLJ, schwere Leberschädigung, chron. Alkoholismus, Einnahme innerhalb der letzten 6h</p>
	<p><b>NW:</b> keine Nebenwirkungen zu erwarten</p>		
	<p> Reevaluation (ABCDE, NSR)</p> <p> Methoxyfluran: 1x wiederholbar</p> <p> Paracetamol: nicht wiederholbar</p>		