











# Starke Schmerzen

## Starke Schmerzen

	<b>A</b> je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt <b>B</b> Tachypnoe? <b>C</b> Tachykardie?, Blässe? <b>D</b> Schmerzen, Schwindel?, Unruhe? <b>E</b> Ereignisbezogener Zusammenhang (Trauma, ..)? Schonhaltung, Mimik, Gestik	 <b>Monitoring</b>	
	<b>Diagnose</b> allgemeine atraumatische Schmerzen ab NSR > 3 Viszeralschmerz ab NRS > 3 Traumatisch bedingter Schmerz		
	<b>Keypoints</b> <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen		
	<b>Methoxyfluran inhal.</b> ab 18. vLJ: 1E  <b>NW:</b> keine Nebenwirkungen zu erwarten		<b>KI:</b>  Kinder, Kopfverletzung, kardiovaskuläre Instabilität, resp. Insuffizienz, Niereninsuffizienz, Bewusstlosigkeit, maligne Hyperthermie
	 Reevaluation (ABCDE, NSR)   Methoxyfluran: 1x wiederholbar		

Revision #5

Created 24 December 2022 05:16:43 by Admin

Updated 9 February 2023 06:06:54 by Admin