













# Übelkeit und Erbrechen

## Übelkeit und Erbrechen

	<b>A</b> je nach Bewusstseinszustand frei, gefährdet, verlegt <b>B</b> Tachypnoe? <b>C</b> Tachykardie?, Blässe? <b>D</b> Schmerzen, Schwindel?, Unruhe? <b>E</b> Massive Übelkeit, bereits Erbrochen?	 <b>Monitoring</b>	
	<b>Diagnose</b>  Ausgeprägte Übelkeit und / oder Erbrechen jeglicher Herkunft Längere Transportwege		
	<b>Keypoints</b>  <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach ABCDE setzen <input type="checkbox"/> Nicht mit anderen Medikamenten in einer Infusion mischen		
	<b>Venenzugang (i.v.)</b>		
	<b>Granisetron i.v.</b> ab 12. vLJ: 3 mg langsam i.v.		<b>KI:</b>   < 12. vLJ, Schwangerschaft
<b>NW:</b> Kopfschmerzen, Wärmegefühl, Flush, QT-Verlängerung			
	 Reevaluation (ABCDE)		
	 <b>KEINE Wiederholung</b>		

Revision #1

Created 10 July 2024 15:15:38 by Admin

Updated 10 July 2024 15:28:50 by Admin