


# Anaphylaxie Algorithmus



## <sup>1</sup> Lebensbedrohliche ABC Probleme:

**A:** Schwellung der Luftwege, Heiserkeit, Stridor

**B:** Tachypnoe, Giemen, Müdigkeit, Zyanose, SpO<sub>2</sub> < 92%, Verwirrtheit

**C:** Blässe, Schwitzen, Hypotonie, Schwäche, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit

## <sup>2</sup> Adrenalin (i.m. außer Sie haben Erfahrung mit i.v. Adrenalin) (wiederholen Sie nach 5 Min, falls keine Besserung)

Erwachsene	500 µg i.m. (0,5 ml)
Kinder >12 J.	500 µg i.m. (0,5 ml)
Kinder 6-12 J.	300 µg i.m. (0,3 ml)
Kinder < 6 J.	150 µg i.m. (0,15 ml)

Adrenalin soll nur durch erfahrene Spezialisten i.v. gegeben werden  
Titration mit Boli von 50 µg (Erwachsene), 1 µg/kg (Kinder)

## <sup>3</sup> I.v. Flüssigkeitsbolus (Kristalloide):

Erwachsene: 500 – 1000 ml  
Kinder: 20 ml/kg

Stoppen Sie i.v. Kolloide  
falls diese als Ursache in  
Frage kommen.

## <sup>4</sup> Chlorphenamine Injektionslösung ist in deutschsprachigen Ländern nicht im Handel

### Dimetinden/Clemastin (langsam i.v.)

Erwachsene oder Kinder > 12 J.	0,1 mg/kg
Kinder ab 1 Jahr	0,03 mg/kg

### <sup>5</sup> Hydrokortison (i.m. oder langsam i.v.)

Erwachsene oder Kinder > 12 J.	200 mg
Kinder 6-12 J.	100 mg
Kinder 6 Monate - 6 J.	50 mg
Kinder < 6 Monate	25 mg

---

Revision #1

Created 2 July 2024 10:20:36 by Admin

Updated 2 July 2024 10:22:31 by Admin