

Bradykardie bei Erwachsenen

BRADYKARDIE BEI ERWACHSENEN



- Beurteilung nach dem ABCDE Konzept
- SpO₂, EKG, BP Monitoring
- Sauerstoffgabe wenn SpO₂ < 94%, i.v. Zugang
- 12-Kanal EKG
- Reversible Ursachen erkennen und behandeln (z.B. Myokardinfarkt oder Elektrolytverschiebungen)



Zeichen für Lebensgefahr?


1. Schock
 2. Synkope
 3. Myokardiale Ischämie
 4. ausgeprägte Herzinsuffizienz
- oder unmittelbar nach ROSC

JA



NEIN





***Alternative Medikamente sind:**

- Aminophyllin
- Dopamin
- Glucagon (wenn die Bradykardie durch Betablocker oder Kalziumkanalblocker induziert ist)
- Glycopyrrolat (kann statt Atropin verwendet werden)

BP - Blutdruck; EKG – Elektrokardiogramm; i.v. - intravenös; ROSC - Wiederkehr des Spontankreislaufs; SpO₂ - Sauerstoffsättigung (pulsoxymetrisch gemessen)

Deutscher Rat für Wiederbelebung (German Resuscitation Council, www.grc-erg.de) 2025,
© European Resuscitation Council vzw (www.erc.edu)
Referenz: Poster_Bradykardie_Algorithmus_GER_2025 über GRC

Revision #1

Created 2026-05-29 20:28:32 UTC by Raphaela Dünser

Updated 2026-05-29 20:29:42 UTC by Raphaela Dünser