

# Diazepam

**rektaltubeIndikation laut Arzneimittelliste**

**Medikamentenliste 1: Bestehender zerebraler Krampfanfall**

**Wirkstoffgruppe**

Benzodiazepin

**Kontraindikationen**

Kinder unter dem 1. vollendetem Lebensjahr

**Nebenwirkungen**

Müdigkeit, Atemdepression, Bradykardie, evtl. paradoxe Reaktion (Erregungszustände)

**ACHTUNG:** Alkohol, Psychopharmaka und Opioide verstärken die Wirkung!







**Dosierung laut Arzneimittelliste**

**Diazepam rektal (Rectiole)**

1. bis 3. vollendetes Lebensjahr (bis 15 kg): 5 mg

3. bis 7. vollendetes Lebensjahr: 10 mg

**Praxistip**

1.  1. Verschlusskappe durch vorsichtiges zwei- bis dreimaliges Drehen entfernen.
2.  2. Den Patienten auf dem Bauch oder seitlich, mit einem Kissen unter den Hüften, lagern. Kleine Kinder können über den Knien liegen.
3.  3. Führen Sie die Nase der Tube in den After ein. Bei Kindern bis zu 3 Jahren nur bis zur ersten Markierung einführen.
4.  4. Die Tube während des gesamten Vorganges stets mit der Nase nach unten halten.
5.  5. Nicht so!
6.  6. Nach Einführen die Tube durch Zusammenpressen des Daumens und Zeigefingers entleeren.
7.  7. Tube unter fortgesetztem Zusammendrücken herausziehen. Halten Sie die Gesäßbacken für einen Moment zusammen, um ein Auslaufen zu verhindern.
8.  8. Ein geringer Rest, der in der Tube verbleibt, hat keinen Einfluss auf die korrekte Dosierung.

Handelsname: Stesolid®, Valium®

## Wirkung

Diazepam wirkt spannungs-, erregungs- und angstdämpfend sowie sedierend und hypnotisch. Es dämpft den Muskeltonus und wirkt antikonvulsiv. Diazepam bindet an spezifische Rezeptoren im Gehirn und verstärkt dadurch die hemmende Wirkung der GABA-Transmitter. Der gesamte Erregungszustand des Nervensystems wird somit herabgesetzt.



Revision #9

Created 26 December 2022 17:02:10 by Admin

Updated 9 February 2023 10:44:54 by Admin