

# Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern

Säugling/Kind reagiert nicht  
Fehlende oder nicht normale Atmung

Notarzt anfordern

5 initiale Beatmungen

Atemkontrolle  
Fehlende oder nicht normale Atmung

15 Thoraxkompressionen : 2 Beatmungen  
Weiter im Wechsel mit 15 : 2, bis Lebenszeichen vorhanden sind

Defibrillation mit Kinderelektroden (Leistungsabschwächung)  
Wenn diese nicht verfügbar sind, AED mit Standardelektroden

Absaugbereitschaft

#### Atemwege freimachen:

Säugling: Kopf in Neutralstellung  
Kind: Kopf geringfügig überstrecken

#### Beatmungen:

Mit 10-15 Liter Sauerstoff  
Bei Schwierigkeiten – doppelter C-Griff

#### Thoraxkompressionen:

Säugling: 2-Daumen-Thoraxkompressionen  
Kind: Ein-Hand- oder Zwei-Hand-Methode

Druckpunkt: Mitte Brustkorb  
Drucktiefe: 1/3 der Brustkorbtiefe  
Frequenz: 100-120/ min

Revision #2

Created 25 March 2024 08:23:29 by Admin

Updated 25 March 2024 08:33:26 by Admin