

Vorbereitung und Anwendung

- Vorbereitung und Anwendung

Vorbereitung und Anwendung

Vorbereitung und Anwendung


Lokalisation Trochanter major (großer Rollhügel)

Der Trochanter major ist ein gut tastbarer Knochenvorsprung an der seitlichen Oberseite des Oberschenkels. Er gehört zum oberen Abschnitt des Oberschenkelknochens (Femur). Seitlich der Hüfte unterhalb des Beckenkamms tastbar – etwa auf Höhe des Hüftgelenks.

- Am einfachsten zu ertasten, wenn die/der Patient:in auf dem Rücken liegt und das Bein leicht rotiert wird.
- Wichtiger Orientierungspunkt für das korrekte Anlegen der Beckenschlinge (nicht auf Höhe der Beckenkämme!).




© ÖRK LV Vorarlberg



© Adobe Stock | RKNÖ RDMED

Beachte: Beckenschlingen werden häufig in einer falschen Position angelegt.

Der häufigste Fehler besteht darin, die Beckenschlinge über dem Darmbein (ungefähr in der Position eines Gürtels) anzulegen. Eine falsche Platzierung ist mit einer unzureichenden Schienung von Beckenfrakturen und möglicherweise einer weniger effektiven Blutungskontrolle verbunden. Die korrekte Position über dem großen Trochanter kann bis zu 10–20 cm unter diesem Niveau liegen. Es ist wichtig, die genaue Position des großen Trochanters zu identifizieren, bevor die Beckenschlinge angelegt wird, um eine korrekte Platzierung sicherzustellen.



© DRK Mühlenkreis